



Afvoerredenen van koeien

Koeien worden om verschillende redenen afgevoerd. Zo kan een koe na een aantal succesvolle lactaties worden afgevoerd wegens ouderdom, een andere koe kan al vóór de tweede lactatie worden afgevoerd omdat ze niet meer drachtig wil worden. Maar wat zijn de redenen om een koe af te voeren? En hoe vaak komt deze reden dan voor landelijk gezien?

In tabel 1 staan de verschillende afvoerredenen, met daarbij aangegeven hoe vaak ze procentueel voorkomen, gebaseerd op ruim honderdduizend koeien met opgegeven afvoerredenen in 2023. Duidelijk zichtbaar is dat vruchtbaarheid en gezondheid de hoofdredenen zijn voor de afvoer van koeien. Het slachtrijp zijn van een koe volgt daarop, samen met een lage productie. Een aantal dieren wordt nog afgevoerd op basis van ouderdom, vanwege melkbaarheid of omdat ze overtollig zijn. In de afvoerredenen 'overig' zijn alle redenen samengevoegd die minder dan 1% worden opgegeven en bevat onder andere problemen rondom voeding, afkalven, exterieur of gedrag.

De percentages weergegeven in tabel 1 zijn gebaseerd op gegevens uit meerdere lactaties. Er zijn echter meerdere afvoerredenen die vaker of minder vaak in een latere lactatie zullen voorkomen. Om een duidelijker beeld te krijgen zijn in figuur 1 de percentages per afvoerredenen neergezet voor de lactaties 1 t/m 10.

In de eerdere lactaties is de voornaamste reden van afvoer de vruchtbaarheid van een koe, been- en klauwaandoeningen als reden van afvoer doen zich voor-

Afvoerredenen	Percentage van afvoer
Vruchtbaarheid	19
Been-/klauwaandoening	19
Hoog celgetal/mastitis	15
Overige gezondheid	12
Afgemest/slachtrijp	11
Lage productie	8
Ouderdom	4
Overtollig	4
Melkbaarheid	3
Overig*	5

* Overig bevat onder andere afvoer vanwege voeding, afkalven, exterieur en gedrag

Tabel 1: Percentage afvoer per afvoerredenen. Deze gegevens zijn gebaseerd op 103.073 afgevoerde koeien in 2023 waarbij afvoerredenen is opgegeven


namelijk voor in iets latere lactaties (lactatie 4-6) en een hoog celgetal als reden van afvoer komt voornamelijk voor in de latere lactaties (lactatie 7-8).

Overige gezondheid, slachtrijp en een lage productie komen procentueel minder vaak voor in latere lactaties. Voor ouderdom als reden van afvoer geldt, logischerwijs, het tegenovergestelde.

Kortom

De belangrijkste afvoerredenen zijn gerelateerd aan gezondheid en de meest voorkomende redenen zijn afvoer vanwege vruchtbaarheid, klauwgezondheid, uiergezondheid en overige gezondheid. De reden van afvoer

verandert over het leven van een koe. In de eerst drie lactaties is vruchtbaarheid de belangrijkste afvoerreden, in latere lactaties zijn klauwgezondheid en uiergezondheid belangrijker afvoerredenen. Uiteindelijk is ouderdom de hoofdafvoerreden in zeer hoge lactaties.



Figuur 1: Percentage afvoer per afvoerreden over lactaties heen