



1. Mortellaro			
1 = beginnend 2 = acuut 4 = chronisch	1 - lokaal geringe ronde ontsteking van de huid <2 cm, niet pijnlijk bij aanraken	2 - oppervlakkige acute ontsteking van de huid - meestal 2-4 cm, pijnlijk bij aanraken	4 - chronische ontsteking van de huid - niet pijnlijk bij aanraken
2. Stinkpoot			
1 = licht 2 = matig 3 = ernstig	1 - stinkende aantasting tussenklauwhuid/eczeem - enkele oppervlakkige hoorndefecten balgebied	2 - stinkende aantasting tussenklauwhuid - één of enkele V-vormige kloven in het balgebied - niet tot aan het leven	3 - stinkende aantasting tussenklauwhuid - zoolzweer in kloof - pijnlijke zwelling huid balgebied
3. Zoolbloeding			
1 = licht 2 = matig 3 = ernstig	1 geelverkleuring over hele oppervlak of een enkel bloedinkje in de zool	2 bloedingen in de zool over 20 tot 50 procent van het oppervlak	3 - grote bloedingen - loslating zool over groot oppervlak
4. Wittelijns defect			
1 = licht 2 = matig 3 = ernstig	1 bloedinkje in de witte lijn	2 bloeding in de witte lijn met pusvorming	3 wandzweer
5. Zoolzweer			
1 = licht 2 = matig 3 = ernstig	1 kneuzing op typische plek	2 zware kneuzing op typische plek	3 gat in de zool, kan uitpuilen, erg pijnlijk
6. Chron. bevangenheid	7. Tyloom	8. Dikke hak	9. Teenpuntnecrose
			
Symptomen duidelijke groeiringen aan voorzijde en/of knik	Symptomen weefselwoekering in de tussenklauwspleet	Symptomen verdikking aan de buitenzijde van de hak	Symptomen - stinkend gat in de punt van de klauw - klauw wordt steeds korter
10. Tussenklauwontsteking	11. Kurketrekkerklauw	12. Asymmetrische klauw	13. Axiale wandscheur
			
Symptomen - zwelling hele kroonrand - ernstige kreupelheid en koorts	Symptomen - buitenklauwen zijn langer en draaien naar binnen - en punt naar boven, koe loopt enigzins op wand	Symptomen duidelijke verschillen tussen binnen- en buitenklauw in breedte en hoogte	Symptomen zeer pijnlijk defect aan de binnenzijde van de hoornschoen, vaak lineair defect